

¿Jak by měli pacienti Increlex® Používat?

- ✿ Increlex by měl být podán dvakrát denně
- ✿ Increlex by měl být podán krátce před jídlem nebo ihned po jídle dvakrát denně
- ✿ Jestliže Increlex nelze podat krátce před jídlem nebo ihned po jídle, pak dávku přípravku Increlex nepodávejte.
- ✿ Dávejte pozor na známky a příznaky nízké hladiny krevního cukru, o kterých jste byli poučeni lékařem nebo sestrou. Mějte u sebe vždy zdroj cukru pro případ, že by se známky nízké hladiny krevního cukru objevily.
- ✿ Místo podání injekce je třeba s každou dávkou měnit

Střídejte místa

- ✿ Břicho
- ✿ Hýždě
- ✿ Stehno
- ✿ Horní část paže

✿ Pokud vynecháte dávku, nikdy nezvyšujte dávku následující, abyste vynechanou dávku nahradili. Následující dávku podejte v obvyklou dobu

✿ Uchovávejte Increlex v chladničce (2 °C - 8 °C), ale chraňte před mrazem.

 **increlex**[®]
Mekasermin

DÁVKOVACÍ KARTA

Jak používat Increlex při léčbě závažného primárního nedostatku IGF-1

Informace pro rodiče, pečovatele a pacienty. Vyplňte pacientovo jméno a dávku, než tento dokument pacientovi předáte - poskytuje užitečné a důležité informace o podávání přípravku Increlex.

Aktuálně platné SmPC lze vyhledat na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v sekci Databáze léků na adrese https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/

- ▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Jak používat tuto dávkovací kartu

Tabulky na následujících stranách byly navrženy, aby Vám pomohly vypočítat příslušnou dávku na injekci pro Vašeho pacienta. V prvním sloupci tabulky naleznete váhu pacienta, číslo uvedené pod dávkou v mg/kg je počet jednotek na injekci.

Dávka (v jednotkách) na injekci se vypočítá s pomocí tohoto vzorce:

$\text{Hmotnost (kg)} \times \text{jedna dávka (mg/kg)} \times 10 = \text{počet jednotek v injekci}$

Doporučená zahajovací dávka je 0,04 mg/kg podávaná dvakrát denně subkutánní injekcí. Pokud je pacientem dobře tolerována po dobu alespoň jednoho týdne, lze dávku dále zvyšovat o přírůstek 0,04 mg/kg a to až na maximální dávku 0,12 mg/kg dvakrát denně.

Nemají se překračovat dávky vyšší než 0,12 mg/kg dvakrát denně, protože to může zvyšovat riziko novotvarů

Dávka je počítána v jednotkách, jelikož je Increlex podáván za použití inzulínové stříkačky.

- ✿ Rozmezí dávek od 0,04 mg/kg do 0,12 mg/kg dvakrát denně
- ✿ Rozmezí jednotek na stříkačce od 2 do 84 jednotek
- ✿ Místo podání injekce je třeba s každou dávkou měnit
- ✿ Increlex je třeba vždy podávat krátce před jídlem nebo ihned po jídle

Hypoglykémie

Jestliže se při doporučených dávkách objeví hypoglykémie navzdory dostatečnému příjmu potravy, je třeba dávku snížit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: <https://nezadouciucinky.sukl.cz/>

Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 49/48, Praha 10, 100 00, email: farmakovigilance@sukl.gov.cz. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Pro pacienta s hmotností 5 až 37 kg

Pro pacienta s hmotností 38 až 70 kg

Váha pacienta (kg)	Dávka na injekci (mg/kg) dvakrát denně										Váha pacienta (kg)	Dávka na injekci (mg/kg) dvakrát denně									
	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10	.11	.12			.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10	.11	.12	
5	2	3	3	4	4	5	5	6	6		38	15	19	23	27	30	34	38	42	46	
6	2	3	4	4	5	5	6	7	7		39	16	20	23	27	31	35	39	43	47	
7	3	4	4	5	6	6	7	8	8		40	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
8	3	4	5	6	6	7	8	9	10		41	16	21	25	29	33	37	41	45	49	
9	4	5	5	6	7	8	9	10	11		42	17	21	25	29	34	38	42	46	50	
10	4	5	6	7	8	9	10	11	12		43	17	22	26	30	34	39	43	47	52	
11	4	6	7	8	9	10	11	12	13		44	18	22	26	31	35	40	44	48	53	
12	5	6	7	8	10	11	12	13	14		45	18	23	27	32	36	41	45	50	54	
13	5	7	8	9	10	12	13	14	16		46	18	23	28	32	37	41	46	51	55	
14	6	7	8	10	11	13	14	15	17		47	19	24	28	33	38	42	47	52	56	
15	6	8	9	11	12	14	15	17	18		48	19	24	29	34	38	43	48	53	58	
16	6	8	10	11	13	14	16	18	19		49	20	25	29	34	39	44	49	54	59	
17	7	9	10	12	14	15	17	19	20		50	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
18	7	9	11	13	14	16	18	20	22		51	20	26	31	36	41	46	51	56	61	
19	8	10	11	13	15	17	19	21	23		52	21	26	31	36	42	47	52	57	62	
20	8	10	12	14	16	18	20	22	24		53	21	27	32	37	42	48	53	58	64	
21	8	11	13	15	17	19	21	23	25		54	22	27	32	38	43	49	54	59	65	
22	9	11	13	15	18	20	22	24	26		55	22	28	33	39	44	50	55	61	66	
23	9	12	14	16	18	21	23	25	28		56	22	28	34	39	45	50	56	62	67	
24	10	12	14	17	19	22	24	26	29		57	23	29	34	40	46	51	57	63	68	
25	10	13	15	18	20	23	25	28	30		58	23	29	35	41	46	52	58	64	70	
26	10	13	16	18	21	23	26	29	31		59	24	30	35	41	47	53	59	65	71	
27	11	14	16	19	22	24	27	30	32		60	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
28	11	14	17	20	22	25	28	31	34		61	24	31	37	43	49	55	61	67	73	
29	12	15	17	20	23	26	29	32	35		62	25	31	37	43	50	56	62	68	74	
30	12	15	18	21	24	27	30	33	36		63	25	32	38	44	50	57	63	69	76	
31	12	16	19	22	25	28	31	34	37		64	26	32	38	45	51	58	64	70	77	
32	13	16	19	22	26	29	32	35	38		65	26	33	39	46	52	59	65	72	78	
33	13	17	20	23	26	30	33	36	40		66	26	33	40	46	53	59	66	73	79	
34	14	17	20	24	27	31	34	37	41		67	27	34	40	47	54	60	67	74	80	
35	14	18	21	25	28	32	35	39	42		68	27	34	41	48	54	61	68	75	82	
36	14	18	22	25	29	32	36	40	43		69	28	35	41	48	55	62	69	76	83	
37	15	19	22	26	30	33	37	41	44		70	28	35	42	49	56	63	70	77	84	

Jméno pacienta:

Dávka v jednotkách:

Kontaktní informace

Jméno ošetřujícího lékaře:

Ordinace/kontaktní telefon:

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.